



## // Les landes sèches

HABITAT NATUREL

LANDES SECHES

VULNÉRABLE

### DESCRIPTION DE L'HABITAT

**Période d'observation optimale** : mai-septembre

**Hauteur de la végétation** : le plus souvent inférieure à 1 m. (buissonnant).

**Composition** : dominé par des arbustes nains, en particulier des bruyères, la Callune et l'Ajonc nain.

**Sol** : très filtrant (rocaillieux ou riche en sable) et acide.

Les landes sèches se développent en pleine lumière sur des sites bien exposés et des sols acides pauvres en éléments nutritifs et s'asséchant rapidement. Elles sont dominées par des ligneux de petite taille, des genêts et des ajoncs, ainsi que la Bruyère cendrée et la Callune dont la floraison colore le milieu d'un rose pourpré caractéristique en été. Cette formation buissonnante héberge souvent une strate herbacée riche en graminées vivaces, plantes annuelles, mousses et lichens. Les landes sèches constituent une végétation transitoire entre la forêt et la pelouse et leur persistance est étroitement liée à une exploitation cyclique de la forêt ou au pastoralisme. Elles représentent en région un habitat de nidification privilégié pour l'Engoulevent d'Europe. Elles accueillent également d'autres espèces d'oiseaux remarquables, comme l'Alouette lulu ou la Fauvette pitchou, ainsi que des cortèges caractéristiques d'Orthoptères (Gomphocère tacheté, Criquet des ajoncs...) ou de papillons (Azurés du Genêt et de l'Ajonc, Petit paon de nuit...).

### COMMENT LES RECONNAÎTRE ?



Lande en surplomb de la retenue d'eau de Sidiailles (Cher)

### QUELQUES ESPÈCES TYPIQUES

Cladonie en cou de girafe



Bruyère cendrée



Cuscutte de la bruyère



Siméthris de Mattiazzi



Bruyère vagabonde



Ciste faux-ajoncs



Glaieul d'Illyrie



Ajonc nain



Ciste en ombelle

## MENACES

Les landes sèches étaient traditionnellement valorisées par le pâturage ovin et caprin ou exploitées pour la terre de bruyère ou la récolte des genêts et des bruyères pour la confection de balais. Leur régression est due à l'abandon des activités traditionnelles avec pour conséquences l'embroussaillage, la densification du couvert forestier ou leur enrésinement (plantation de pins).



Genêt pileux

### À RETENIR :

→ En région Centre-Val de Loire, **71 ZNIEFF de type 1** (Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) abritent des landes sèches à bruyères (8 %).



Sabline des montagnes

## STATUT DE L'HABITAT

Classement dans la liste rouge régionale :



- Habitat déterminant de ZNIEFF
- Habitat d'intérêt communautaire (Natura 2000)

## SITUATION EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

### Contexte national :

Les landes sèches sont surtout rencontrées dans la moitié ouest de la France où le contexte pédologique et le climat atlantique leur sont favorables. Elles se raréfient vers le nord-est et sont pratiquement absentes dans le Bassin méditerranéen.

### Répartition régionale :

En Centre-Val de Loire, les landes sèches se rencontrent surtout dans les régions naturelles boisées. Les grandes surfaces sont en forte raréfaction et elles se limitent souvent en contexte forestier ou bocager à un linéaire étroit sur les talus des bords des routes et des chemins. Elles restent néanmoins répandues sur les sables de Sologne et de la Forêt d'Orléans. Mais on les trouve aussi dans l'arc forestier du Perche, le bassin de Savigné, la Forêt de Chinon, le Richelais, la forêt de Loches, la Brenne, les Forêts de Châteauroux et de Chœurs-Bommiers, la Marche.....

### Mesures de préservation et de gestion :

Comme de nombreux milieux ouverts, les landes sèches ne sont généralement plus entretenues et ont tendance à s'embroussailler et à se reboiser spontanément. Lorsque les arbustes deviennent trop denses, une coupe rase permet généralement de redynamiser la lande sous-jacente. Un broyage ou un pâturage régulier permet de contenir l'embroussaillage.

Les plantations de pins engendrent aussi un appauvrissement de la diversité des landes. Cependant, un boisement mature très lâche laisse pénétrer suffisamment de lumière au sol pour maintenir une lande diversifiée.



Azuré de l'Ajone



Lande à Ciste faux-alysson en Sologne (Cher)

## Bibliographie :

Nature Centre et CBNBP, 2014 -  
*Livre rouge des habitats naturels et des espèces menacés de la région Centre.*

[Fiche de la DIREN Centre sur les landes sèches \(2004\)](#)

[Fiche sur les landes sèches dans les cahiers d'habitats Natura 2000](#)

### Légende

Présence de landes sèches



Nulle

Forte



Sites d'observation de landes sèches




Criquet des ajoncs



Callune

Carte de présence des landes sèches en Centre-Val de Loire et localisation des régions naturelles où les observer, avec quelques exemples de sites  
(cliquer sur le nom du site pour plus de renseignements)



\* Sites accessibles uniquement dans le cadre de visites guidées

Sources cartographiques : ©IGN, ©MNHN-CBNBP, 2014, ©DREAL Centre-Val de Loire

Crédits photographiques : © MNHN/CBNBP (R. Dupré, S. Gautier, A.-H. Paradis et R. Poncet, N. Robouam) ; © CEN Centre-Val de Loire (E. Speh et S. Gressette)

Rédacteurs :

Rémi Dupré, CBNBP.  
Octobre 2018.

