



// Les tourbières acides

HABITAT NATUREL

TOURBIERES

EN DANGER CRITIQUE

DESCRIPTION DE L'HABITAT

Période d'observation
optimale : juin-août

Hauteur de la végétation :
20 à 50 cm (aspect ras).

Composition : dominée par
les sphaignes, mousses
capables d'absorber de
grosses quantités d'eau et
prenant souvent des teintes
chatoyantes en période
estivale.

Sol : tourbeux, saturé d'eau
en permanence.



COMMENT LES RECONNAÎTRE ?



← Queue de l'étang des Lévrys en Sologne (41)



Tapis de sphaignes dans une mare forestière de Sologne (41) ↑

QUELQUES ESPÈCES TYPIQUES



MENACES

Les tourbières acides en bon état de conservation sont plutôt stables dans le temps. Il faut veiller à **ne pas polluer l'eau du bassin versant** alimentant la tourbière, notamment par des épandages azotés, sous peine de voir proliférer les hautes herbes aux dépens des espèces typiques, moins compétitives. Les **coupes à blanc massives** sont aussi à proscrire dans le périmètre de la tourbière à cause de la dégradation résultante sur la qualité des eaux de surface. En cas de **déficit hydrique** ou de **drainage**, y compris en périphérie de la tourbière, les ligneux se développent et la tourbe a tendance à se dégrader, entraînant un boisement rapide et la disparition de ce milieu remarquable et des espèces rares associées.

À RETENIR :

→ En région Centre-Val de Loire, **72 ZNIEFF de type 1** (Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) abritent des tourbières acides ou des landes tourbeuses (**8 %**).



Azurée des mouillères

STATUT DE L'HABITAT

Classement dans la liste rouge régionale :



Degré de menace

Habitat d'intérêt communautaire (Natura 2000)

SITUATION EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Contexte national :

Les plus fortes densités de tourbières acides, ou tourbières à sphaignes, se trouvent en montagne (précipitations et humidité atmosphérique élevées). Elles sont habituellement de petites tailles et disséminées en plaine où elles sont particulièrement impactées par la régression généralisée des zones humides.

Répartition régionale :

En Centre-Val de Loire, les tourbières à sphaignes se trouvent principalement en Sologne (surtout en bordure est) et, plus localement, dans le Perche, le Pays Fort, la Marche, la Brenne et le Bassin de Savigné. Elles sont absentes ou anecdotiques dans les autres régions naturelles. La carte de la page suivante, extraite des travaux réalisés dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE), illustre leur probabilité de présence en région. La méthodologie complète est disponible sur le [site de l'ORB](#).

Mesures de préservation :

Considérant l'importance des zones humides dans la gestion du territoire, des politiques nationales se sont mises en place pour tenter de limiter leur raréfaction ou leur morcellement, comme la Loi sur l'eau ou le Plan national d'action (PNA) en faveur des milieux humides. En région, peu de tourbières à sphaignes sont préservées et gérées efficacement. On peut citer la Tourbière des Froux dans le Perche, à la fois Réserve Biologique Dirigée et en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, gérée par l'Office National des Forêts, et deux Espaces Naturels Sensibles du Cher, la Tourbière de la Guette (plus grande tourbière à sphaignes régionale avec 23 ha) et la Tourbière des Landes dont la gestion est assurée respectivement par la Communauté de Communes des Villages de la Forêt et le Conservatoire d'espaces naturels du Centre-Val de Loire.



Une mare forestière avec un radeau de sphaignes en Sologne viticole (41)

Potentialité de présence des lieux tourbeux et localisation de sites où observer des tourbières acides
(cliquer sur le nom du site pour plus de renseignements)

Bibliographie :

Nature Centre et CBNBP, 2014 -
Livre rouge des habitats naturels et des espèces menacés de la région Centre.

Sur les tourbières :

[Les tourbières](#) (site ORB)

[Pôle-relais tourbières](#) (centre de ressources sur les tourbières en France)

Dans le Loir-et-Cher


3 - Etang des Lévrays

En Eure-et-Loir

- 1 - [Forêt humide des Mousseuses](#)
- 2 - [Tourbière des Froux](#)

Dans le Cher

- 4 - [Tourbière des Landes*](#)
- 5 - [Tourbière de la Guette](#)



Légende

Présence potentielle de zones tourbeuses



Faible

Forte



Site d'observation de zones tourbeuses

Dans l'Indre

6 - Tourbière résiduelle de Passebonneau

* Site accessible uniquement dans le cadre de visites guidées